

CAV Agrotheek heeft in samenwerking met Bayer Crop Science weer diverse luizenvangbakken geplaatst in de regio Noord-Holland-Noord. Iedere 2 dagen worden deze bakken geleegd en worden de “vangsten” bij de NAK in Emmeloord onderzocht en gedetermineerd op luizensoort.

Voor de poot aardappelteelt is de luizensituatie een belangrijke maatstaf voor mogelijke virusoverdracht. Meer (gevaarlijke) luizen betekent meer kans op overdracht van virus. Een bespuiting van een luisdodend middel kan door goede informatievoorziening op een juist tijdstip toegediend worden.

Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de luizenuitslag zoals deze verzonden wordt door CAV Agrotheek.



Bladluivangsten Vangbak: Sluiswegje St. Maarten (56)

Analyse uitgevoerd door de NAK, Emmeloord.

Bladluisoort:	relatieve efficiëntie	Onderzoeksdatum:																	Cumulatieve virusdruk:	aant.bladluizen / soort vanaf 1e aftap			
		Aftapdatum:																					
		8-jun	9-jun	11-jun	15-jun	15-jun	17-jun																
		5-jun	8-jun	10-jun	12-jun	14-jun	16-jun																
Groene perzikluis	1																				0	0	
Bruine violenluis	1																					0	0
Sjalotteluis	0,01																					0	0
Hopluis	0,45																					0	0
Aardappeltopluis	0,01																					0	0
Zwarte bonenluis	0,1		1																			0,1	1
Wegedoornluis	0,6																					0	0
Erwteluis	0,1		1																			0,1	1
Appelgrasluis	0,03			1																		0,03	1
Roos-grasluis	0,01																					0	0
Groene kortstaartluis	0,01																					0	0
Vuilboomluis	0,32																					0	0
Melige koolluis	---																					---	0
Overige kortstaartluizen	---																					---	0
Boterbloemluis	0,01																					0	0
Andere luizen	---	21	25	23	3	6	0															---	78
Totale virusdruk tot en met de laatste aftapdatum:																					0,23		
Totale aantal luizen		21	27	24	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	
Tijdsduur analyse (min)		10	15	10	8	5	12															60	

In het overzicht wordt een cumulatieve virusdruk weergegeven. Luizen die virus goed kunnen overbrengen (o.a. groene perzikluis, bruine violenluis, hopluis, wegedoornluis) worden zwaarder meegerekend dan overige luizen.

De vangbakken zijn geplaatst in: Burgerbrug, St. Maarten, Wieringerwaard, Slootdorp, Wieringerwerf (richting robbenoordbos), Wieringerwerf (richting Medemblik).

Wilt u ook meerdere keren per week de actuele luizensituatie bekijken per mail, meld u dan snel aan! Geef uw e-mailadres door aan Dirk Jansen: d.jansen@agrotheek.nl dan wordt u opgenomen in de mailinglijst.