



CAV Agrotheek

Tulpengalmijt

De laatste jaren neemt schade in de bloembollen en bolbloementeelt van tulpen veroorzaakt door de tulpengalmijt toe. De schade is primair uitval in zowel broeierij als kwekerij. Secundair heeft ook de handel in bollen last van deze plaag. Niemand wil bollen met tulpengalmijt kopen. Momenteel heeft alleen Actellic een toelating in de bestrijding tegen tulpengalmijt. Het is belangrijk dat dit middel op een juiste wijze wordt ingezet.

Voor een goed bestrijdingseffect van Actellic® zijn de volgende punten van belang:

- Een verdachte partij binnen 7 dagen douchen, kistenkantelen of aangieten met Actellic. Alleen met deze methode wordt gebruik gemaakt van de contact werking van Actellic en wordt ruim voldoende residu aangebracht.
- Bij toepassing via de LVM-methode moet de eerste behandeling binnen een week en de 2^e behandeling de week erna plaatsvinden. Hierna nog 2 - 4 maal herhalen.
- Houd de cel na toepassing minimaal 6 uur dicht (geen lucht verversen), doch liefst langer (10-12 uur).
- Wanneer Actellic wordt toegediend met een kistenkantelaar of natgieten dient de cel minimaal 6 uur of langer dicht gehouden te worden. Een herbehandeling kan worden verkregen door de cel meerdere malen minimaal dicht te houden (geen luchtverversing).
- Zorg dat de cel volgestapeld is, dek anders de stapels tijdelijk af met plastic.
- Infectie vanaf besmet afval is mogelijk. Galmijt verplaatst zich o.a. door luchtstroming. Voer afval van verdachte partijen of aangetaste partijen daarom zo snel mogelijk af.
- Indien besmet afval niet direct kan worden verwijderd, sla het dan zodanig op dat de mijten niet vanaf dit afval via de luchtstroming bij gezonde partijen of in de cel kunnen belanden.
- Zorg voor een schone schuur en schoon fust.
- Doseringen Actellic:
 - LVM ruimtebehandeling: 1,5 - 3 ml per m³ celinhoud.
 - Kistenkantelaar: 2,5 ml per 100 l bollen.
 - Natgieten: 2,5 ml per 100 l bollen, 1 l water per 100 l bollen.
 - Douchen: galmijt 0,25%, bollenmijt 0,5%.

Standaard met 2 lvm nozzles



Ook als gebruik wordt gemaakt douche, aangiet of kandel technieken blijft een ruimte behandeling nodig om herbesmetting te voorkomen nodig. Als er geen aantasting verwacht wordt volstaat alleen een ruimte behandeling. Vanaf 0,5 milligram Actellic per kg bollen wordt bollenmijt oppervlakkig bestreden. Deze hoeveelheid is prima met een LVM Nozzle aan te brengen. De vernevelcapaciteit, plaatsing van de nozzle, concentratie Actellic en moment van toepassen bepalen het resultaat. Voor de ruimtebehandeling verkoopt CAV Agrotheek al jaren een standaard met 2 lvm nozzles. Dit systeem is goedkoop en onderhoudsarm. De DLV heeft dit systeem als een van de beste vernevelsystemen getest.

Aktie.

Als u een LVM nozzle nodig heeft en u besteld bij ons Actellic geven wij in de maanden juni, juli en augustus 10% korting op een complete LVM nozzle set. (zolang de voorraad strekt).