

Agrotheek Brassica Schema

▲ Slootdorp Kadeweg 3
1774 BJ Slootdorp
tel. (0227) 58 17 41
fax (0227) 58 19 41

▲ Middenmeer Industrieweg 2-6 tel. (0227) 50 21 41 fax (0227) 50 14 61
▲ Ursem Rustenburgerweg 2A tel. (072) 50 200 95 fax (072) 50 380 44
▲ Hoogkarspel De Gouw 73 tel. (0228) 56 46 56 fax (0228) 56 33 37

Mestnormen 2010

Wittekool	320 kg N/ha	Rodekool	285	pw >55 of onbekend	75kg P2O5/ha
Bloemkool	230	Spitskool	285	pw 36-55	80
Broccoli	270	Boerenkool	170	pw <36	85

KOOLVLIEG

Rijenbeh. Volveldsbeh. Plantvoetbeh. Kweekplaat/plantbedbeh. Coating

Mundial

Tracer

12cc per 1000 (5,6)

(2,2)

ps. Bescherming middels insecticidecoating, is niet altijd afdoende. Ga in dit verband uit van een effectieve werking van 10 weken van af zaai. Tot aan plantdata half mei is een nabehandeling met Tracer aan te bevelen.

AARDVLOOIEN

0,5L Perfekthion (vt: 3 weken), zowel blad als grond goed raken (Let op: slechts een bespuiting toegelaten).

Een Caucho of Crouser coating/ dummy-pil/ Phytodrip geeft voldoende werking.

(Perfekthion tot 13 juni 2010 toegelaten)

WILDSCHADE (duiven, hazen)

attributen: Scaryman, (gaskanon, alarm pistool; vergunning vereist)

Wildnet: 12, 16 en 18m x 125m

Wildnet Plus: 13 en 16m x 135m

ONKRUID

voor toepassen

tijdens toepassen

na toepassen

Spuitomstandigheden:



Onkruidvrij:

2-3L Butisan + 0,4L Grounded

2L Butisan + 100-200cc Centium

Grove druppel, nat gewas, spitse gewasstand en afgehard gewas geven minder kans op gewasreactie van Centium.

Kleine onkruiden:

2kg Lentagran

Split-up toepassing:

Klein onkruid nog geen bodemherbicide gespoten:

- 0,5kg Lentagran + 2L Butisan S na een week 1,5kg Lentagran

Wel bodemherbicide gespoten:

- 1kg Lentagran na een week 1kg Lentagran

grassen:

1,5 - 2L Aramo (let op spuitomstandigheden; 3 weken)

Bij hoge kiemdruk van: Varkensgras, Zwaluw tong, Dovenetel, Melganzevoet en Perzikkruid, heeft de combinatie met Centium de voorkeur.

Centium niet toepassen bij primeur koolrassen i.c.m. lichte grond.

- Grounded hecht bodemherbicide aan de toplaag van de grond.

- Spuiten op een sterk, afgehard gewas.

- Bij veel regen (>40mm) spoedig na toepassing, kans op schade bij gebruik van Butisan S.

- Butisan S niet toepassen als de koolteelt wordt gevolgd door een Butisan gevoelige nateelt.

sl
ui
tk
o
ol

2
0
1
0

Agrotheek Brassica Schema



▲ Slootdorp Kadeweg 3
1774 BJ Slootdorp
tel. (0227) 58 17 41
fax (0227) 58 19 41

▲ Middenmeer Industrieweg 2-6 tel. (0227) 50 21 41 fax (0227) 50 14 61
▲ Ursem Rustenburgerweg 2A tel. (072) 50 200 95 fax (072) 50 380 44
▲ Hoogkarspel De Gouw 73 tel. (0228) 56 46 56 fax (0228) 56 33 37

sluitkool 2010

INSEKTEN

tijdens toepassen

na toepassen

Spuitomstandigheden:



KOOLLUIZEN

Volvelds

0,5L Perfekthion (3 weken, tot 13 juni 2010) of 0,5kg Pirimor (1 week) of 0,4kg Plenum(2 weken) + uitvloeier
0,25L Decis (1 week) of 0,2L Somicidin (10 dagen) of 0,05L Karate Zeon (1 week)

Hoge druk: 0,5kg Pirimor + 0,4kg Plenum + uitvloeier. Na 7 dagen 0,4kg Plenum + uitvloeier

KOOLGALMUG

Vanaf half mei phytodrip of dummiepil combineren met een karate Zeon bespuiting in week 2, 4 en 6.

Uitvloeier toevoegen.

Minimaal met 600L water spuiten. Hart van de plant goed raken.

KOOLRUPSEN (KOOLWITJE, KOOLMOT)

- jong open gewas: 0,25L Decis (<23°C)/ 0,2L Somicidin/ 50cc Karate Zeon

- boven 23°C 80 gram Steward (1 dag) of 0,4 Nomolt (2 weken)

- hoge druk 200cc Tracer (3 dagen)

TRIPS (thrips tabacci)

preventief: - 50cc Karate Zeon + 1L Bio Sweet (0 dagen)

- 200cc Tracer + 1L Bio Sweet

curatief, op enkele planten worden tripsen tussen de bovenste bladeren gevonden:

-1,5L Mesurool SC (2 weken) maximaal 2 toepassingen + 1L Bio Sweet


In het stadium vanaf koolvorming, wekelijks uw kool inspecteren op trips.

SCHIMMELS

tijdens toepassen

systemische werking contact werking

Spuitomstandigheden:



BLADVLEKKENZIEKTE (MYCOSPAERELLA en ALTERNARIA) 1^e bespuiting uiterlijk half juli.

preventief: 0,25kg Flint (2 weken sluitkool) of 1L Amistar (2 weken) of 1kg Signum + uitvloeier (2 weken)

Licht curatief: 0,5L Score of 0,6L Folicur SC, (toepassen op advies weerpaal of bij de eerste vlekken in het tussenblad)
(3 weken; sluitkool)

curatief: 0,5L Score + 1kg Signum + uitvloeier of 0,4L Rudis; uitvloeier toevoegen mits niet gemengd(3 weken)

**Toevoegen bij hoge druk
bladvlekkenziekte**

Schema Preventief:

Amistar

Folio Gold (en Score)

Amistar top

Vroege oogst
Score (en Folio)

late oogst
Rudis (en Folio)

juli

augustus

september

oktober

Bladvlekkenziekte
Witte roest
Vitaliteit

Valse meeldauw
Bladvlekkenziekte
Echte meeldauw

Rotstruik
Bladvlekkenziekte
Echte meeldauw

Agrotheek Brassica Schema



▲ Slootdorp Kadeweg 3
1774 BJ Slootdorp
tel. (0227) 58 17 41
fax (0227) 58 19 41

▲ Middenmeer Industrieweg 2-6 tel. (0227) 50 21 41 fax (0227) 50 14 61
▲ Ursem Rustenburgerweg 2A tel. (072) 50 200 95 fax (072) 50 380 44
▲ Hoogkarspel De Gouw 73 tel. (0228) 56 46 56 fax (0228) 56 33 37

Sluitkool							
Groep	Merknaam	Werkzame stof	veiligheid stermijn	MRL mg/kg	doppenbeperking	Spuitvrije zone	teeltvrije zone
Herbiciden	Butisan S	metazachloor	Nvt	0.3	90 % dop *	Nvt	Nvt
Herbiciden	Centium	Clomazone	Nvt	0.01	Nvt	Nvt	Nvt
Herbiciden	Lentagran	Pyridaat	Nvt	0.2	Nvt	Nvt	Nvt
Herbiciden	Aramo	Tepraloxymidim	21	1	Nvt	Nvt	Nvt
Insecticide	Tracer	Spinosad	3		90% opp. water	Nvt	Nvt
Insecticide	Plenum	Pymetrozine	14		Nvt	Nvt	Nvt
Insecticide	Karate Zeon	Lambda-cyhalothrin	7		75% opp. water		
Insecticide	Mesurool	Methiocarb	14				
Insecticide	Sumicidin Super	Esfenvaleraat	10		75% opp. water		
Insecticide	Nomolt	Teflubenzuron	14		Nvt		
Insecticide	Steward	Indoxacarb	1				
Insecticide	Pirimor	Pirimicarb	7	1	Nvt	Nvt	Nvt
Insecticide	Decis	Deltamethrin	7	0.5	Nvt	Nvt	Nvt
Insecticide	Spruzit	Piperonylbutoxide	2	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
Fungicide	Amistar	azoxystrobin	14	5	Nvt	Nvt	Nvt
Fungicide	Flint	trifloxystrobine	14		nvt	nvt	Nvt
Fungicide	Signum	Boscalid pyraclostrobin	14		nvt	nvt	nvy
Fungicide	Score	difenoconazool	21		75% opp. water	nvt	Nvt
Fungicide	Horizon	tebuconazool	21		75% opp. water	1,5m	Nvt
Fungicide	Folicur SC	tebuconazool	21		75% opp. water	nvt	Nvt
Fungicide	Folio Gold	Chloorthalonil Metalaxyl-m	14		nvt	nvt	Nvt
Fungicide	Rovral	iprodion	14		75% opp. water	nvt	nvt
Molluscide	Caragoal	methaldehyde	nvt		1 maart en 31 aug.	nvt	Nvt
Molluscide	Brabant Slakkendood	methaldehyde	nvt		1 maart en 31 aug.	nvt	Nvt
Molluscide	Ferramol	ferri-fosfaat	nvt			nvt	nvt