


Agrotheek Tulpen Schema

▲ Slootdorp Kadeweg 3
1774 BJ Slootdorp
tel. (0227) 58 17 41
fax (0227) 58 19 41

▲ Middenmeer Industrieweg 2-6 tel. (0227) 50 21 41 fax (0227) 50 14 61
▲ Ursem Rustenburgerweg 2A tel. (072) 50 200 95 fax (072) 50 380 44
▲ Hoogkarspel De Gouw 73 tel. (0228) 56 46 56 fax (0228) 56 33 37

Vuurbestrijding

Indien grondvuur wordt verwacht; 1^e bespuiting rond opkomst met 0,4L Rudis per ha.



Basismiddel	toevoeging
0,4L Shirlan	
0,4L Shirlan of 0,25kg Flint	+ 1,5kg Dithane DG of 2,5L Mancozeb
0,4L Shirlan of 0,25kg Flint	+ 1,5kg Dithane DG of 2,5L Mancozeb + 0,5L Mantrac
0,4L Shirlan of 0,35L/0,6kg Folicur	+ 1,5kg Dithane DG of 2,5L Mancozeb + 0,5L Mantrac
0,35L/ 0,6kg Folicur	+ 1,5kg Dithane DG of 2,5L Mancozeb + 0,5L Mantrac
0,35L/ 0,6kg Folicur	+ 1,5kg Dithane DG of 2,5L Mancozeb + 1L Omnical
Koppen	
0,35L/0,6kg Folicur	+ 1,5kg Dithane DG of 2,5L Mancozeb + 0,5L Mantrac
0,4L Shirlan of 0,25-0,4 L Rudis	+ 1,5kg Dithane DG of 2,5L Mancozeb + 1L Omnical
0,4L Shirlan of 0,25kg Flint	+ 1,5kg Dithane DG of 2,5L Mancozeb + 1L Omnical
0,3L Shirlan of 0,25kg Flint	+ 1,5kg Dithane DG of 2,5L Mancozeb
0,3L Shirlan	
0,3L Shirlan	

Bij toepassing van Folicur SC zijn er restricties bij gebruik van Rudis en Spirit(zie etiket).

Bij beginnende vuur aantasting 0,4L Rudis toepassen.

Als hulpmiddel bij de bepaling van de vuurdruk, het type middel en het moment van spuiten kunt u gebruik maken van Beslissings Ondersteunende Systemen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met CAV Agrotheek.

In perioden met vorstkansen zijn Mancozeb, Kenbyo en Flint relatief zacht voor het gewas.

Virus overdracht

Vanaf opkomst (begin op tijd!) bij +/- 10°C tot +/- 1 week voor de oogst, wekelijks een bespuiting uitvoeren met;

of 400ml/ha Sumicidin Super

eventueel + 5L Olie H

of 50ml/ha Karate Zeon (niet in bloeiende gewassen)

eventueel + 5L Olie H

Bij gebruik Olie geen Shirlan toepassen.

Let op: bij voorkeur olie apart spuiten

Chemische selectie: Voor de eerste luizenvlucht starten met selecteren!

Tot en met april: 50% Regnone + 50% minerale olie

20% water + 70% Roundup MAX + 10% Reglone

Krassen van het blad wat aangestipt wordt verhoogd het bestrijdingseffect.

Bij een hoge luisdruk toevoegen;

0,5kg Pirimor; (bij warm, rustig weer)

230gr Gazelle; 14 daags of 200 gr. wekelijks

250ml Calypso; 14 daags of 150cc wekelijks

100 gram Admire; (sterkste middel tijdens sterke gewasgroei, niet in bloeiende gewassen)

T
U
L
P
2
0
1
1


Agrotheek Tulpen Schema

▲ Sloodorp Kadeweg 3
1774 BJ Sloodorp
tel. (0227) 58 17 41
fax (0227) 58 19 41


▲ Middenmeer Industrieweg 2-6 tel. (0227) 50 21 41 fax (0227) 50 14 61
▲ Ursem Rustenburgerweg 2A tel. (072) 50 200 95 fax (072) 50 380 44
▲ Hoogkarspel De Gouw 73 tel. (0228) 56 46 56 fax (0228) 56 33 37

Virusbestrijding tulp, gemiddeld 6 proeven over 3 jaar

Virusproef Zwaagdijk, tulp



Stelregel chemische virusreductie:



Pyrethroiden: 20 - 40%
Plus Luisdoder: 40 - 60%
Plus Olie: 60 - 80%

Onkruidbestrijding

Chloor-IPC+
Afbrandmiddel

STOMP

Pyramin

1,5L Dual Gold

4 - 7L Asulox

2L Stomp

3L Glyfosaat

3kg Pyramin

0 - 4 Chloor-ipc

Dual Gold: grasachtigen, duivekervel, kamille
Goltix: melganzevoet en straatgras
Pyramin: perzikkruid, herderstasje, kamille en muur
Stomp: varkensgras, perzikkruid, muur, ereprijs, paarse dovenetel
Cipc: muur en kleine brandnetel

Raaigras en Granen 2 - 3L Focus Plus
Kweekgras 6L Focus Plus
Straatgras 2L Aramo (toepassen na de bloei!)

- Voor opkomst kunnen Dual Gold en Stomp gemengd verspoten worden.
- Toevoeging van 0,5L Grounded per ha zorgt voor een beter hechting van de bodemherbiciden.
- Bodemherbicide bespuitingen uitvoeren op een vochtige grond.
- Nooit vóór of na nachtvorst of hagel spuiten, de waslaag heeft ± 3 dagen nodig om te herstellen.
- Vanaf 6 °C kan Asulox toegepast worden.
- Stomp en Dual Gold zijn minder effectief op gronden met meer dan 10% humus en 35% slib.
- Bij toepassing van Dual Gold voor inzaai van gras, kerende grondbewerking uitvoeren.

T
U
L
P

2
0
1
1